RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

APO-FAMOTIDINE

Comprimés de famotidine, norme USP

COMPRIMÉS APO-FAMOTIDINE

Le médecin et le pharmacien peuvent obtenir les renseignements d'ordonnance complets.

Apo-Famotidine est la marque déposée d'Apotex Inc. pour la substance appelée famotidine. Ce médicament est délivré **sur ordonnance seulement**. La famotidine fait partie de la classe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs histaminiques H_2. Ces composés permettent de réduire la quantité d'acide produite dans l'estomac. Ils sont donc utiles pour le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum ou pour le traitement d'autres affections, comme le reflux gastro-oesophagien ou le syndrome de Zollinger-Ellison, caractérisées par une surproduction d'acide au niveau de l'estomac.

Important

Ce médicament est prescrit pour le traitement d'un problème de santé particulier et pour votre usage personnel seulement. Ne pas le donner à d'autres personnes ni l'utiliser pour traiter d'autres affections.

Ne plus utiliser un médicament après la date d'expiration indiquée sur la boîte.

Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Lire les informations suivantes avec attention. Si vous désirez des explications ou de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT

Il est possible que ce médicament ne convienne pas à certaines personnes. Si vous croyez que l'une des situations suivantes s'applique à votre cas, faites-le savoir à votre médecin:

- Vous avez déjà pris de la famotidine ou un autre médicament de la même classe (c.-à-d. des antagonistes des récepteurs histaminiques H_2) et vous avez manifesté une allergie à l'un des composants du médicament ou subi des réactions défavorables.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir.
- Vous allaitez ou avez l'intention de le faire.
- Vous souffrez d'une maladie du foie ou d'une maladie du rein confirmée.

Votre médecin doit également savoir si vous prenez d'autres médicaments, que ce soit un médicament délivré sur ordonnance ou obtenu en vente libre.

MODE D'EMPLOI DU MÉDICAMENT

- Suivez **rigoureusement** les directives de votre médecin. Pour le traitement des ulcères, on recommande généralement une dose unique à prendre au moment du coucher, mais il peut arriver que la posologie soit différente. Quel que soit le cas, suivez les directives de votre médecin ou votre pharmacien.
- S'il le juge nécessaire, votre médecin pourra également vous recommander de prendre un antiacide.
- Si vous oubliez de prendre un comprimé, prenez-le dès que vous vous apercevez de votre oubli, à moins que cette dose ne se trouve trop rapprochée de la suivante. Si tel est le cas, attendez et conformez-vous à l'horaire établi par votre médecin. **Ne prenez jamais deux doses du médicament à la fois.**
- **L'INNOCUITÉ D'APO-FAMOTIDINE CHEZ L'ENFANT N'A PAS ENCORE ÉTÉ ÉTABLIE.**
- Observez rigoureusement les directives établies par votre médecin concernant le régime alimentaire. Certaines boissons ou aliments ou certains médicaments, comme l'aspirine, peuvent avoir un effet irritant sur l'estomac et aggraver votre état.
- Même si vous commencez à vous sentir mieux, n'interrompez pas votre traitement, car il arrive souvent que la douleur s'estompe avant la guérison complète. **Ne modifiez pas la posologie et n'interrompez pas la prise de votre médicament sans en parler d'abord avec votre médecin.**
- **N'amorcez pas de traitement avec d'autres médicaments** sauf si vous en avez déjà discuté avec votre médecin.
- Conservez la plaquette dans la boîte, à l'abri de la chaleur et de la lumière, et dans un endroit sec.

RÉACTIONS DÉFAVORABLES AU MÉDICAMENT - CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE

En plus de l'effet escompté, tout médicament peut parfois occasionner des réactions indésirables. La plupart des gens, toutefois, n'ont aucun problème lorsqu'ils prennent ce médicament.

Prévenez votre médecin dès l'apparition de l'une des réactions suivantes: maux de tête, étourdissements, constipation et diarrhée.

D'autres réactions peuvent également survenir chez certains patients. Si vous notez, en cours de traitement, des symptômes inhabituels, consultez votre médecin.

INGRÉDIENTS

Principe actif: Chaque comprimé d'Apo-Famotidine contient de la famotidine et est présenté en deux teneurs: 20 mg (beige) et 40 mg (brun clair).

FABRICANT D'APO-FAMOTIDINE

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston, Ontario
M9L 1T9

RAPPEL

Ce médicament vous a été prescrit à vous personnellement. N'en donnez à personne d'autre.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de conseils, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien.

203376

APOTEX INC.
SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE ENTIÈREMENT CANADIENNE